



Atonik active plusieurs processus clés dans les cellules végétales

Stimulation de la production d'auxine

Augmentation du flux plasmatique

Renforcement des parois cellulaires par lignification



Pour en savoir plus, consultez le site internet atonik.fr

Culture, dose l/ha, nb max. d'applications	Objectif du traitement et recommandations	Cible
Grandes cultures		
Colza 0,6 l/ha Max 2 Intervalle : 14 j	Dommages après l'hiver, plantes affaiblies au début du printemps, à partir du début de la montaison (BBCH 31) Dommages causés par <i>Dasineura brassicae</i> , mélange en cuve avec un fongicide contre la sclérotinia en pleine floraison. Sûr pour les abeilles. Stabilisation des siliques pour augmenter la résistance aux ravageurs des siliques, tels que la cécidomyie des siliques, à partir du milieu de la floraison, par exemple en combinaison avec un fongicide contre le sclérotinia.	Récupération plus rapide, stimulation de la ramification, rendement plus élevé Une lignification renforcée des siliques réduit l'infiltration possible de la cécidomyie des siliques, amélioration générale de la pollinisation, plus de grains dans les siliques et rendement accru.
Betteraves industrielles et fourragères 0,6 l/ha max 2 applications Intervalle : 7 j	Stress dû aux herbicides, principalement des combinaisons avec clomazone, lenacil, clopyralide... Traitement herbicide dans des conditions défavorables (faiblesse des tissus sensibles, moindre couverture de cire foliaire, température élevée, soleil). Mélange en cuve avec le 2e et le 3e traitement herbicide.	Réduction du stress dû aux herbicides Développement vigoureux et rapide des plantes Rendement plus élevé et meilleure qualité
Lin fibre 0,6 l/ha Max 2 Intervalle : 14 j	Rendement plus élevé de fibres longues. 1 application au début d'élongation puis une deuxième dans les 15 jours qui suivent. Possibilité d'application en mélange avec un herbicide ou un fongicide.	Amélioration de la composition et qualité du lin. Rendement plus élevé en fibre
Lin oléagineux 0,6 l/ha Max 2 Intervalle : 14 j	2 applications : 1ère application au début de l'élongation, généralement en mélange en cuve avec un herbicide/ fongicide. 2ème application avant ou au début de la floraison.	Amélioration de la composition et qualité du lin. Rendement plus élevé en huile